

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

ELOCOM

Crème de furoate de mométasone à 0,1 %

Pommade de furoate de mométasone à 0,1 %

Lotion de furoate de mométasone à 0,1 %

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée par suite de l'homologation d'ELOCOM pour la vente au Canada, et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Il ne s'agit que d'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d'ELOCOM. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament

La crème, la pommade et la lotion ELOCOM (furoate de mométasone) dosées à 0,1 % sont indiquées pour :

- le soulagement de l'enflure et des démangeaisons provoquées par des maladies de la peau comme le psoriasis et la dermatite atopique. La lotion peut être appliquée sur le cuir chevelu.

Les effets de ce médicament

ELOCOM exerce des effets anti-inflammatoires et vasoconstricteurs (il provoque la contraction des vaisseaux sanguins) visant à atténuer l'enflure et les démangeaisons. Toutefois, son mode d'action exact reste inconnu.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament

N'utilisez pas la crème, la pommade ni la lotion ELOCOM à 0,1 %

- si vous êtes allergique au furoate de mométasone, à d'autres corticostéroïdes ou à l'un des ingrédients qui entrent dans la composition de ces produits. (Voir la section *Les ingrédients non médicinaux importants*).
- si vous êtes présentement atteint(e) d'une infection de la peau d'origine fongique, bactérienne ou virale (par ex. herpès, varicelle ou vaccine).

L'ingrédient médicinal

Furoate de mométasone

Les ingrédients non médicinaux importants

Crème :

- octényl-succinate d'amidon aluminium
- cétéareth-20
- hexylèneglycol
- acide phosphorique
- monostéarate de propylèneglycol
- eau purifiée
- alcool stéarylique
- dioxyde de titane
- paraffine molle
- cire blanche

Pommade :

- hexylèneglycol
- acide phosphorique
- monostéarate de propylèneglycol
- eau purifiée
- paraffine molle
- cire blanche

Lotion :

- hydroxypropylcellulose
- alcool isopropylique
- acide phosphorique
- propylèneglycol
- eau purifiée
- orthophosphate monosodique

La présentation

- La crème ELOCOM à 0,1 % se présente en tubes de 15 g et de 50 g.
- La pommade ELOCOM à 0,1 % se présente en tubes de 15 g et de 50 g.
- La lotion ELOCOM à 0,1 % se présente en flacons de plastique de 30 mL et de 75 mL.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser ELOCOM si :

- vous avez déjà éprouvé des effets secondaires lors de l'emploi du furoate de mométasone ou antérieur d'autres dermocorticoïdes (médicament anti-inflammatoire appliqué sur la peau), comme :
 - une réaction allergique;
 - de l'irritation;
 - une inhibition de la fonction surrénale (caractérisée par une coloration plus foncée de la peau, de la fatigue, une hypotension, de la diarrhée et des problèmes de digestion);

- vous prenez actuellement un médicament antifongique ou antibactérien pour lutter contre une infection;
- vous êtes enceinte ou vous allaitez;
- vous avez déjà utilisé un médicament à base d'hormones stéroïdes;
- vous avez une mauvaise circulation causée par une dermatite de stase (une inflammation de la peau) ou d'autres maladies de la peau.

Pour usage externe seulement sur la peau ou le cuir chevelu.

N'appliquez pas ces produits dans les yeux ni autour des yeux.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

On **NE** sait **PAS** si ELOCOM interagit avec d'autres médicaments.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Posologie habituelle

Crème et pommade ELOCOM : Appliquez une mince couche de produit sur la peau affectée une fois par jour ou à la fréquence recommandée par votre médecin; massez délicatement pour que le produit pénètre bien dans la peau.

Lotion ELOCOM : Appliquez quelques gouttes de lotion sur la peau affectée (y compris, au besoin, sur le cuir chevelu) une fois par jour ou à la fréquence recommandée par votre médecin; massez délicatement et soigneusement jusqu'à ce que le médicament soit complètement absorbé.

NE couvrez **PAS** la peau et le cuir chevelu traités d'un pansement hermétique.

Utilisez ELOCOM en suivant à la lettre les instructions de votre médecin. **NE l'employez PAS en plus grande quantité, plus souvent ni pendant plus longtemps que ce que vous a recommandé votre médecin.** L'utilisation exagérée d'ELOCOM pourrait accroître le risque d'effets secondaires indésirables, voire dangereux.

Ce médicament vous a été prescrit à vous. Ne permettez à PERSONNE d'autre de l'utiliser. Il pourrait être nocif pour d'autres personnes, même si leurs symptômes ressemblent aux vôtres.

Surdose

Symptômes : fatigue, faiblesse, perte d'appétit, constipation, nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre, assombrissement de la couleur de la peau (surtout sur les cicatrices, les coudes, les genoux, les jointures des doigts, les orteils, les lèvres et les muqueuses).

Traitement : **En cas de surdose, communiquez immédiatement avec votre médecin ou un centre antipoison.**

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

En plus de ses effets bienfaits, ELOCOM peut provoquer des effets indésirables.

Parmi les effets secondaires qui peuvent survenir suite à l'utilisation de ce médicament, on trouve les suivants : sensations de brûlure, de picotement ou de fourmillement, démangeaisons intenses de la peau et signes d'atrophie de la peau (amaigrissement de la peau), de même qu'une inflammation des follicules pileux et des réactions ressemblant à de l'acné.

Quoique très rares, les effets secondaires suivants pourraient se produire : aggravation de la maladie, sécheresse de la peau, rougeur anormale, apparition de furoncles, aggravation de l'allergie, dermatite (enflure de la peau), grossissement des lésions et nausées.

De plus, les effets secondaires suivants se sont produits avec d'autres dermocorticoïdes : infection ou signes d'infection, irritation, pousse de poils indésirables, éclaircissement de la couleur de la peau, dermatite (enflure de la peau) autour ou près de la bouche, dermatite de contact allergique, vergetures, inhibition de la fonction rénale révélée par une diminution de l'émission d'urine, une hausse de la pression sanguine, des palpitations cardiaques, un essoufflement, des démangeaisons, des nausées, une perte d'appétit, des maux d'estomac et une inflammation des articulations.

**EFFETS SECONDAIRES GRAVES :
FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE**

Symptôme / effet		Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
		Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas	
Peu fréquent	Réaction allergique au médicament (frissons, fièvre, douleurs musculaires ou autres symptômes pseudogrippaux accompagnant ou précédant l'apparition d'éruptions cutanées)			√
Rare	Symptômes associés à une inhibition de la fonction rénale (voir les symptômes énumérés ci-dessus)			√
Rare	Symptômes associés à une inhibition de la fonction surrénale (voir les symptômes énumérés dans la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS)			√

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise d'ELOCOM, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Ce produit doit être conservé à une température de 15 à 30 °C.

N'utilisez pas le produit si la date de péremption apparaissant sur l'étiquette est échu.

Gardez hors de la portée des enfants.

SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS

Pour surveiller l'innocuité des médicaments, Santé Canada recueille des renseignements sur les effets inattendus et graves des médicaments. Si vous croyez que vous avez une réaction inattendue ou grave à ce médicament, vous pouvez en faire mention à Santé Canada :

par téléphone (numéro sans frais) : 866 234-2345
par télécopieur (numéro sans frais) : 866 678-6789
par courriel : cadrmp@hc-sc.gc.ca

par courrier :
Centre national des EI
Division de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés
Direction des produits de santé commercialisés
Pré Tunney, IA : 0701C
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

REMARQUE : Avant de communiquer avec Santé Canada, vous devriez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit, préparée pour les professionnels de la santé, en communiquant avec le promoteur, Merck Canada Inc., au : 1 800 463-5442.

Merck Canada Inc. a rédigé ce dépliant.

Dernière révision : Le 14 décembre 2011