

Comprimés **PEPCID**[®]

Le médecin et le pharmacien peuvent obtenir les renseignements d'ordonnance complets.

PEPCID[®] est la marque déposée pour la substance appelée famotidine. Ce médicament est délivré **sur ordonnance seulement**. La famotidine fait partie de la classe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes des récepteurs histaminiques H₂. Ces composés permettent de réduire la quantité d'acide produite dans l'estomac. Ils sont donc utiles pour le traitement de certains ulcères de l'estomac ou du duodénum ou pour le traitement d'autres affections, comme le reflux gastro-œsophagien ou le syndrome de Zollinger-Ellison, caractérisées par une surproduction d'acide au niveau de l'estomac.

Important – Ce médicament est prescrit pour le traitement d'un problème de santé particulier et pour votre usage personnel seulement. **Ne pas le donner à d'autres personnes ni l'utiliser pour traiter d'autres affections.**

Ne plus utiliser un médicament après la date d'expiration.

Garder tous les médicaments hors de la portée des enfants.

Lire les informations suivantes avec attention. **Si vous désirez des explications ou de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.**

CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT

Il est possible que ce médicament ne convienne pas à certaines personnes. Si vous croyez que **l'une** des situations suivantes s'applique à votre cas, faites-le savoir à votre médecin :

- Ne prenez pas PEPCID[®] si vous êtes allergique à l'un de ses composants ou à un autre antagoniste des récepteurs histaminiques H₂.
- Vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir.
- Vous allaitez ou avez l'intention de le faire.
- Vous souffrez d'une maladie du foie ou d'une maladie du rein confirmée.
- Votre médecin doit également savoir si vous prenez d'autres médicaments, que ce soit un médicament délivré sur ordonnance ou obtenu en vente libre.

MODE D'EMPLOI DU MÉDICAMENT

- Suivez **rigoureusement** les directives de votre médecin. Pour le traitement des ulcères, on recommande généralement une dose unique à prendre au coucher, mais il peut arriver que la posologie soit différente. Quel que soit le cas, votre médecin ou votre pharmacien demeure la personne la mieux indiquée pour vous renseigner.
- S'il le juge nécessaire, votre médecin pourra également vous recommander de prendre un antiacide.
- Si vous oubliez de prendre un comprimé, prenez-le dès que vous vous apercevez de votre oubli, à moins que cette dose ne se trouve trop rapprochée de la suivante. Si tel est le cas, attendez et conformez-vous à l'horaire établi par votre médecin. **Ne prenez jamais deux doses du médicament à la fois.**
- L'INNOCUITÉ DE PEPCID[®] CHEZ L'ENFANT N'A PAS ENCORE ÉTÉ ÉTABLIE.
- Observez rigoureusement les directives établies par votre médecin concernant le régime alimentaire. Certains aliments ou boissons et certains médicaments, comme l'acide acétylsalicylique (AAS), peuvent avoir un effet irritant sur l'estomac et aggraver votre état.
- Même si vous commencez à vous sentir mieux, n'interrompez pas votre traitement, car il arrive souvent que la douleur s'estompe avant la guérison complète. **Ne modifiez pas la posologie et n'interrompez pas la prise de votre médicament sans en parler d'abord avec votre médecin.**
- PEPCID[®] n'interagit généralement pas avec les autres médicaments que vous pourriez prendre. Toutefois, il est important que vous informiez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux que vous avez obtenus sans ordonnance.
- Conservez les comprimés à une température comprise entre 15 °C et 30 °C dans un contenant hermétiquement clos. Protégez de la lumière.

Peut-on conduire une automobile ou faire fonctionner une machine pendant un traitement avec PEPCID®?

Certains effets secondaires qui ont été rapportés avec PEPCID®, comme des étourdissements, peuvent nuire à votre capacité de conduire une automobile ou de faire fonctionner une machine. La réponse de chacun au traitement avec PEPCID® peut varier. **Attendez de connaître votre réaction au traitement avant de conduire une automobile ou de faire fonctionner une machine** (voir **RÉACTIONS DÉFAVORABLES AU MÉDICAMENT – CE QU'IL CONVIENT DE FAIRE**).

Surdosage

Si vous prenez une trop grande quantité de PEPCID®, communiquez immédiatement avec votre médecin, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région.

RÉACTIONS DÉFAVORABLES AU MÉDICAMENT – CE QU'IL CONVIENT DE FAIRE

En plus de l'effet escompté, tout médicament peut parfois occasionner des réactions indésirables. La plupart des gens, toutefois, n'ont aucun problème lorsqu'ils prennent PEPCID®.

Prévenez votre médecin dès l'apparition de l'une des réactions suivantes : maux de tête, étourdissements, diarrhée, constipation et troubles du foie accompagnés de symptômes tels que douleur abdominale, vomissements, fatigue et jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau).

Parmi les autres réactions défavorables rapportées moins fréquemment, on note : sécheresse de la bouche, nausées ou vomissements, malaises gastriques, perte d'appétit, fatigue, éruption cutanée, démangeaisons, perte de cheveux, jaunisse,

douleurs articulaires, crampes musculaires et troubles mentaux; ces réactions ont disparu à l'arrêt du traitement. Des convulsions ont été rapportées, quoique très rarement, chez des patients atteints de troubles rénaux.

Quelques personnes peuvent être allergiques à certains médicaments. Si vous présentez l'une des réactions suivantes après la prise de PEPCID®, cessez le traitement avec ce médicament et communiquez avec votre médecin immédiatement : gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge (accompagné d'une difficulté à respirer ou à avaler), urticaire ou réactions cutanées graves (très rares cas rapportés avec cette classe de médicaments).

D'autres réactions peuvent également survenir. Si vous notez, en cours de traitement, des symptômes inhabituels, consultez votre médecin.

INGRÉDIENTS

Principe actif : Le comprimé PEPCID® contient de la famotidine et est présenté en deux teneurs : 20 mg (beige) et 40 mg (brun clair).

Ingrédients non médicinaux : amidon prégélifié, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, oxyde ferrique jaune, oxyde ferrique rouge, stéarate de magnésium et talc.

® Marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp., filiale de **Merck & Co., Inc.**, utilisée sous licence.

© 2011, Merck Canada Inc., filiale de **Merck & Co., Inc.**
Tous droits réservés.

