

LISEZ CE DOCUMENT POUR VOUS ASSURER D'UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

PREVMIS® **comprimés de létermovir** **létermovir pour injection**

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre **PREVMIS® (létermovir)** et chaque fois que vous renouvelez votre ordonnance. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état de santé et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **PREVMIS®**.

Pourquoi PREVMIS® est-il utilisé?

PREVMIS® est un médicament d'ordonnance qui aide à empêcher les adultes de 18 ans et plus de tomber malades suite à un CMV (cytomégalovirus). Le CMV est un virus dont beaucoup de personnes sont porteuses, mais sans le savoir. Chez la majorité des gens, le CMV reste dans l'organisme sans causer d'effet nuisible. Toutefois, si votre système immunitaire est affaibli après une greffe de moelle osseuse, vous pourriez présenter un risque élevé d'être malade en raison du CMV.

Comment PREVMIS® agit-il?

PREVMIS® est un médicament antiviral. Il empêche le CMV de se multiplier.

Quels sont les ingrédients de PREVMIS®?

Ingrédient médicamenteux : létermovir

PREVMIS® est offert en comprimé ou en solution pour injection intraveineuse.

Ingrédients non médicamenteux :

- Comprimés : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, dioxyde de silice colloïdal, povidone 25 et stéarate de magnésium.

Les comprimés sont enrobés d'une pellicule contenant les ingrédients inactifs suivants : dioxyde de titane, hypromellose 2910, monohydrate de lactose, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge (comprimés à 480 mg uniquement) et triacétine. La cire de carnauba est ajoutée comme agent de satinage.

- Solution pour injection intraveineuse : chlorure de sodium, eau pour injection, hydroxyde de sodium et hydroxypropylbétadex.

PREVMIS® est offert sous les formes posologiques qui suivent :

Comprimé : 240 mg et 480 mg.

Solution pour injection : 20 mg/mL. Offerte à 240 mg/12 mL et à 480 mg/24 mL.

Ne prenez pas PREVYMIS® si :

- vous êtes allergique au létermovir ou à tout autre ingrédient de PREVYMIS®;
- vous prenez l'un des médicaments suivants :
 - le pimozide (pour le traitement du syndrome de Gilles de La Tourette);
 - des alcaloïdes de l'ergot (pour le traitement des migraines).

Si vous prenez PREVYMIS® avec de la cyclosporine, ne prenez pas de lovastatine, de rosuvastatine, de simvastatine ou de bosentan.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre PREVYMIS® afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et de vous assurer de la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- Si vous souffrez d'une maladie des reins.
- Si vous souffrez d'une maladie du foie.
- Si vous êtes enceinte ou essayez de le devenir. On ignore si PREVYMIS® peut être dangereux pour l'enfant que vous portez.
- Si vous allaitez ou avez l'intention d'allaiter. On ignore si PREVYMIS® peut passer dans le lait maternel et être absorbé par le nourrisson.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec PREVYMIS® :

- Si vous prenez l'un de ces médicaments, assurez-vous d'en aviser votre médecin :
 - Alfentanil, fentanyl (pour traiter la douleur intense)
 - Amiodarone (pour traiter les battements de cœur irréguliers)
 - Midazolam (utilisé comme sédatif)
 - Cyclosporine, tacrolimus, sirolimus (pour prévenir les rejets de greffe)
 - Voriconazole (pour traiter les infections fongiques)
 - Statines, comme l'atorvastatine, la fluvastatine, la lovastatine, la pravastatine, la rosuvastatine et la simvastatine (pour abaisser un taux élevé de cholestérol)
 - Oméprazole, pantoprazole (pour traiter les ulcères d'estomac et d'autres troubles d'estomac)
 - Glyburide, répaglinide, rosiglitazone (pour abaisser un taux élevé de sucre dans le sang)
 - Carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne (pour traiter l'épilepsie ou les convulsions)
 - Warfarine (pour éclaircir le sang ou pour prévenir les caillots sanguins)
 - Rifabutine, rifampine (pour traiter les infections mycobactériennes)
 - Bosentan (pour abaisser la pression élevée dans les vaisseaux sanguins des poumons)
 - Millepertuis (*Hypericum perforatum*) [produit à base d'herbes médicinales]
 - Éfavirenz, étravirine, névirapine (pour traiter l'infection par le VIH)
 - Modafinil (pour prévenir la somnolence)
- Sachez quels médicaments vous prenez. Conservez une liste de vos médicaments et montrez-la à votre médecin et à votre pharmacien si l'on vous prescrit un nouveau médicament.

- Vous pouvez demander à votre médecin ou à votre pharmacien qu'il vous remette une liste des médicaments qui pourraient interagir avec PREVYMIS®.
- Ne commencez pas à prendre un autre médicament ou ne cessez pas de le prendre sans en avoir d'abord parlé à votre médecin.

Comment prendre PREVYMIS® :

Vous pouvez recevoir PREVYMIS® de deux manières différentes : sous forme de comprimés ou par voie intraveineuse (IV). Il est important de ne pas oublier ou omettre de prendre vos doses de PREVYMIS®.

Dose habituelle chez l'adulte :

Si vous prenez les comprimés :

- **Prenez 1 comprimé une fois par jour.**
 - Prenez-le à la même heure tous les jours.
 - Prenez-le avec ou sans nourriture.
 - Avalez le comprimé entier. Ne cassez pas, n'écrasez pas et ne mâchez pas le comprimé.
- Vous devez prendre ce médicament exactement comme vous l'a prescrit votre médecin.
- Gardez-le dans l'emballage d'origine jusqu'à son utilisation.
- Ne cessez pas de prendre PREVYMIS® sans en parler d'abord avec votre médecin.
- Évitez de manquer de PREVYMIS®.

Si vous recevez PREVYMIS® par voie intraveineuse (IV) :

- Vous recevrez PREVYMIS® une fois par jour, sur une période d'environ 1 heure.

Surdosage :

Si vous prenez une plus grande quantité de PREVYMIS® que la dose prescrite, appelez votre médecin immédiatement.

Si vous croyez avoir pris trop de PREVYMIS®, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez de prendre les comprimés :

Si vous oubliez de prendre votre dose de PREVYMIS®, prenez-la aussitôt que vous vous apercevez de l'oubli. S'il est presque temps de votre prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée et prenez la dose suivante à l'heure prévue.

- Ne prenez pas deux doses de PREVYMIS® en même temps pour compenser une dose oubliée.
- Si vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous recevez PREVYMIS® par voie intraveineuse (IV) :

- Si vous manquez votre rendez-vous, prenez-en un autre immédiatement.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à PREVYMIS®?

En prenant PREVYMIS®, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires courants de PREVYMIS® :

- nausées
- diarrhée
- vomissements

En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Comprimés et solution pour injection :

- Gardez PREVYMIS® dans l'emballage d'origine jusqu'à son utilisation.
- Conservez les comprimés PREVYMIS® à la température ambiante (15 °C à 30 °C).
- Si vous devez conserver la solution pour injection PREVYMIS® à la maison, gardez-la à la température ambiante (15 °C à 25 °C), à l'abri de la lumière.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de PREVYMIS®, vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour le patient sur le médicament. Vous pouvez vous procurer ce document en visitant le site Web de Santé Canada (<http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php>) ou le site de Merck Canada (www.merck.ca), ou en téléphonant chez Merck Canada au 1-800-567-2594.

Pour signaler un effet secondaire lié à PREVYMIS[®], veuillez composer le 1-800-567-2594.

Le présent dépliant a été rédigé par Merck Canada Inc.

Dernière révision : le 8 mai 2020

® Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.

* Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2017, 2020 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.