


LA SENSIBILISATION AU VPH AU CANADA

La prévalence de certains cancers associés au VPH augmente au pays, mais celui-ci reste méconnu, révèle un nouveau sondage

AU CANADA, LES HOMMES ET LES JEUNES ADULTES SONT LES MOINS BIEN INFORMÉS SUR CERTAINS ASPECTS DU VPH

On estime que jusqu'à 75 % des personnes sexuellement actives au Canada contracteront au moins une infection par le VPH au cours de leur vie.¹


Selon les données du sondage :



3 hommes sur 10 (31 %) affirment ne pas savoir ce qu'est le VPH.²



1 jeune adulte sur 3 (18 à 24 ans) (34 %) affirme ne pas savoir ce qu'est le VPH.²




Plus de la moitié des hommes (54 %) disent ignorer à quel point le VPH est répandu.³

RECONNAÎTRE LE VPH COMME UN FACTEUR DE RISQUE DE CERTAINS CANCERS

Le cancer de la gorge (oropharynx) est maintenant le type de cancer le plus courant associé au VPH au Canada. La prévalence des cancers de la gorge associés au VPH a augmenté au Canada au cours des dernières décennies.⁴

Selon les données du sondage :

Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à déclarer savoir que le VPH est un virus pouvant causer le cancer (45 %).⁵



53 %

des hommes et des femmes n'étaient pas au courant de l'augmentation de l'incidence de certains cancers de la tête et du cou associés au VPH, particulièrement chez les hommes.

OBSTACLES ET MESURES À PRENDRE



Selon les données du sondage,


71 %

de toutes les personnes ayant répondu considéraient qu'au moins un obstacle les empêchait de discuter du VPH avec un professionnel de la santé.

Les principaux obstacles :

- **23%** ont cité le manque de connaissances ou d'information
- **20%** ont cité le fait d'être dans une relation monogame
- **16%** ont cité la gêne
- **16%** ont cité le fait de ne pas être sexuellement actifs

Les hommes sont moins enclins que les femmes à croire qu'ils ont un rôle à jouer dans la réduction de leur risque de contracter ou de transmettre le VPH.



Renseignements du sondage

¹ Société canadienne du cancer. Virus du papillome humain. [Cancer.ca](#)

² Par rapport à 22 % de l'ensemble des répondants

³ Par rapport à 43 % des femmes et à 49 % de l'ensemble des répondants

⁴ Gouvernement du Canada. Virus du papillome humain (VPH) : Symptômes et traitement. [Canada.ca](#)

⁵ Par rapport à 34 % de l'ensemble des répondants

⁶ Par rapport à 65 % de l'ensemble des répondants

© 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey (É.-U.) et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

CA-NON-04569

Ce sondage en ligne a été réalisé par Ipsos pour le compte de Merck Canada afin d'évaluer les connaissances, les perceptions et la compréhension du virus du papillome humain (VPH) chez les adultes canadiens. Le sondage a été mené du 6 au 11 mars 2026. Au total, n = 1 000 Canadiens de 18 à 47 ans recrutés par l'entremise du panel d'Ipsos ont répondu au sondage.

Des quotas et des pondérations ont été utilisés pour faire en sorte que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage comporte un intervalle de crédibilité de +/- 3,8 %, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population.

